

Medicingivning i dagtilbud i Morsø kommune

Skrivelsen er udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

- Personalet i dagtilbud har ikke sundhedsfaglig baggrund og er derfor ikke uddannet til at observere og behandle syge børn.
- Akut syge børn må ikke møde i dagtilbud.
- Børn der hjemmefra har fået smertestillende medicin er ikke friske til at komme i dagpleje/børnehave.
- Ved akut sygdom skal forældrene snarest muligt sørge for, at barnet bliver hentet.
- Medicingivning bør så vidt muligt foregå i hjemmet uden for det tidsrum, børnene er i dagtilbud.
- Som udgangspunkt skal personalet ikke påtage sig at give penicillin, øjendråber og lign. præparater som gives en kort periode. Der kan forekomme tilfælde, hvor det må bero på en individuel vurdering på den enkelte institution hvorvidt der laves en undtagelse.

Personalet skal ikke påtage sig at give:

- Håndkøbsmedicin, der ikke er lægeordineret
- Alternativ medicin

Vejledning for instruktion ved kronisk eller langvarig sygdom:

- Det er vigtigt - også for børn med kroniske ikke-smitsomme sygdomme eller længerevarende sygdom, at have adgang til pasning og kontakt til andre børn i den udstrækning, deres sygdom tillader det. Her kan det være nødvendigt at give medicin flere gange i løbet af dagen. Når medicinen *ikke* udelukkende kan gives på tidspunkter uden for barnets tid i dagtilbud, *bør* personalet i det mulige omfang påtage sig at give børn lægeordineret medicin.
- Vurderes det nødvendigt skal personalet have instruks af læge/sygeplejeske.
- Lægeordineret medicin skal være i original emballage med oplysning om barnets navn og evt. CPR.nr., medicinens art og den ordinerede dosis.
- Skønnes det nødvendigt anmodes forældrene om en supplerende skriftlig instruktion fra lægen.
- Medicinen opbevares i aflåst skab
- Det anbefales, at institutionen for hvert barn nedskriver, hvornår og af hvem medicinen er givet.

Akutte tilfælde:

I sjældne tilfælde kan der ved nogle kroniske sygdomme opstå hurtigt nedsættende anfalds fænomener. Det kan fx dreje sig om feberkrampe, epileptiske anfald, kraftige overfølsomhedsreaktioner eller akut forværring af en kronisk tilstand. Den behandlende læge vil i disse tilfælde ofte have ordineret medicin, som personalet efter aftale med forældrene straks kan give samtidig med, at der tilkaldes ambulance/forældre.

Der kan henvises til pjecen: *Smitsomme sygdomme hos børn – vejledning for daginstitutioner, skoler og forældre* – udgivet af Sundhedsstyrelsen.